LES DÉGÂTS NATURELS

DANS LA CULTURE DU SAPIN DE NOËL

Nos sapins grandissent en plein air, au plus près de la nature.
Ils peuvent donc être exposés à différents aléas naturels qui peuvent provoquer des dégâts.

LE CHEVREUIL

Se frotte contre le tronc



Le chevreuil se frotte contre le tronc des jeunes sapins, surtout en période de frayure, ce qui peut casser des branches. Lorsque le sapin est encore petit, il peut aussi manger le bourgeon terminal.



Conséquences : écorcement du tronc, casse des branches, bourgeon terminal mangé, déformation ou ralentissement de la croissance.

LES RAPACES ET LES CORBEAUX

Cassent les pointes



Les rapaces (buses, éperviers...) et les corbeaux se posent parfois sur les jeunes sapins. Leur poids peut casser la pointe terminale, qui est une partie fragile.



Conséquences : pointe cassée, ce qui déforme la croissance du sapin.

LE GEL TARDIF

Brûle les nouvelles pousses



Au printemps, des gelées tardives peuvent survenir alors que les nouvelles pousses viennent juste d'apparaître. Le froid les brûle, ce qui stoppe leur développement.



Conséquences : pointes et nouvelles pousses brûlées, ralentissement de la croissance et déformation du sapin.

LA GRÊLE

Casse les branches et les épines



Les épisodes de grêle peuvent être très violents. Les grêlons frappent les sapins, provoquant la casse des branches et la perte des épines.



Conséquences : branches cassées, épines abîmées ou arrachées, impact sur l'aspect général du sapin.

Ces aléas naturels font partie du cycle de vie de nos sapins.
Malgré ces defis, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des sapins de qualité !

La Ferme Pidoux